



FARVIG S.R.L.

Es un Laboratorio Argentino de especialidades veterinarias, surgido bajo el empeño de profesionales formados no sólo en los claustros universitarios, sino en la práctica de campo y con un enfoque “Productivista” de la **actividad ganadera**.

La ÉTICA, la IDONEIDAD, la COMPLEMENTACIÓN, la INNOVACION y la VERDAD

han sido no sólo nuestras premisas, sino nuestros objetivos en sí mismos, y donde sustentamos el esfuerzo diario en el que nuestra empresa basa los pilares de su funcionamiento.

No se elaboran solamente productos, intentamos “soluciones”; creemos que con la certeza de la **CALIDAD** podemos resolver con un máximo de chances positivas aquellos “problemas nutricionales” que requieren justamente nuestras explotaciones extensivas o intensivas.



SELADE

Cubre las carencias de trazas minerales en la alta producción

REPROSEL EN VENEZUELA
FARVIGSEL EN PARAGUAY



29-15 COOPER FARVIG NF

Biodisponibilidad y seguridad para las graves carencias de cobre





FARVIGFOS D3

Suplemento preventivo, terapéutico, mineral y vitamínico

**VIMOFOS D3
EN VENEZUELA**



FARMAG ZINC

Reposición de sales de Magnesio y Zinc.

**MAGZIPLUS
EN VENEZUELA**



COOPER FARVIG

Biodisponibilidad para las graves carencias de Cobre.

**COBREMEX
EN VENEZUELA**



ENGORMAX

El verdadero engordador, siempre más kilos.

**ENGORVIT
EN VENEZUELA**

SÓLO EXPORTACIÓN



HEPATO PROTECTOR

Regenerador y protector del parénquima y funcionamiento hepático



OXIFLAM LA

Oxitetraciclina asociado con un antiinflamatorio no esteroide, diclofenaco sódico en un vehículo especial.



FARMIN

Suplemento preventivo y terapéutico - Mineral



GEL CUZN

Antiséptico y desinflamante
Gel de uso tópico



LA COMBINACIÓN JUSTA Y CONFIABLE QUE EL MERCADO VETERINARIO NECESITA PARA CUBRIR LAS CARENCIAS DE TRAZAS MINERALES EN LA ALTA PRODUCCIÓN.



INDICACIONES:

• Prevención y tratamiento de los estados carenciales de selenio, fósforo, vitamina A, D y E.



• Previene: osteomalacia y raquitismo, mejora las defensas a infecciones virales y bacterianas, revierte la distrofia muscular (enfermedad del músculo blanco) y entequ seco primario (calcinosis).



• Prevención y tratamiento del anestro nutricional, abortos, retenciones de placenta, absorción embrionaria, mastitis, infertilidad, muerte perinatal, metritis, infosura.



LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS

Esta es la mejor explicación de los “terribles” efectos de las deficiencias minerales en la vida productiva y reproductiva de los seres vivos. No es necesario “ver síntomas” para estar frente a carencias que no dejan manifestar toda la potencialidad genética de los animales.

EFFECTOS NO OBSERVABLES O SUBCLÍNICOS

- Niveles deficitarios de Selenio
- a) Inmunodeficiencia y disfunción enzimática.
- b) Disminución de la máxima producción láctea.
- c) Baja la producción media del animal y se afectan los índices reproductivos.

EFFECTOS OBSERVABLES O CLÍNICOS


• Si la deficiencia nutricional continúa: Se observan los signos clínicos de manifestación de la enfermedad y se incrementan los efectos de la primera etapa, tanto en producción, reproducción o inmunidad.

**Sel
ade**

Sales de Selenio y Fósforo,
adicionadas de vitaminas
ADE. Inyectables



PRESENTACIÓN: Frasco ampolla de 500, 250 y 100 ml



REPROSEL en Venezuela - **FARVIGSEL** en Paraguay

EL VERDADERO ENGORDADOR, SIEMPRE MAS KILOS



INDICACIONES:

Principales:

- Promotor de crecimiento, desarrollo y engorde.



Complementarias:

- Exaltador de anabolismo sin efectos androgénicos secundarios.



- Eleva el índice de conversión alimento - carne, por mayor asimilación de nitrógeno disponible.



- En el tratamiento post quirúrgico y post traumatismo para mejorar la recuperación.

DOSIFICACIÓN:

Bovinos y Equinos:

1.0 ml cada 50 kilos de peso vivo.

Ovinos, Caprinos, Camélidos y Porcinos:

1.0 ml cada 30 kilos de peso vivo.

Inyectable, intramuscular y/o subcutánea.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Anabolizante vitamínico.

Generador de ganancias de kilos extra,
por incremento de la proteína animal.

Produce balance de nitrógeno positivo.

VENTAJAS:



Alta potencia anabólica, nula acción virilizante. Mejora la respuesta inmune. Provoca un adecuado funcionamiento hepato / renal.

Produce un mayor desarrollo y crecimiento corporal, por incremento de la matriz ósea y muscular.

Rapidez de efecto y sinergismo anabólico / vitamínico.

Facilidad y practicidad de aplicación.

Excelente relación costo / beneficio.

Engor Max

Promotor de crecimiento
y engorde más vitaminas



PRESENTACIÓN: Frasco ampolla de 500, 250 y 100 ml

SÓLO PARA EXPORTACIÓN



FÓRMULA:

Activos:

19-Nortestosterona-17-Ciclohexilpropionato (Nandrolona) 1.00 g.
Vitamina A 4750000.00 UI
Vitamina D3 475000.00 UI
Vitamina E 10000.00 UI

Excipientes:

Aceite neutro estéril csp 100.00 ml

PRUEBA DE ENGORMAX COMPARATIVA:

Animales de tipo carniceros híbridos de razas británicas, sobre pasturas asociadas de leguminosas y gramíneas, con peso promedio de 234,60 kgs en los testigos, y de 264,575 kgs. en los tratados.

Al comienzo de la prueba, los 80 animales fueron desparasitados con Ricobendazole al 15% dosificados a razón de 1 ml/40 kpv, por vía subcutánea.

Los tratados recibieron Engormax a razón de 1/50 kpv por vía subcutánea.

CARACTERÍSTICAS	TESTIGOS 40 ANIMALES	TRATADOS 40 ANIMALES
Peso animales comienzo de la prueba	9.384 Kgs	10.583 Kgs
Peso animales finalización de la prueba	10.284 Kgs	11.773 Kgs
Kgs. ganados de en 30 días	900 kgs	1.190 Kgs
Kgs. ganados extra	-	290 Kgs
Ganancia diaria	0,750 Kgs	0,992 Kgs



Bovinos - Ovinos - Caprinos - Camélidos - Equinos - Porcinos

BIODISPONIBILIDAD Y SEGURIDAD PARA LAS GRAVES CARENCIAS DE COBRE. LA MEJOR RELACIÓN COSTO BENEFICIO DEL MERCADO Y LA MEJOR BIODISPONIBILIDAD EN COBRE INYECTABLE.
OBTENGA MÁS TERNEROS, MAS PESADOS Y FUERTES AL DESTETE.



INDICACIONES:

Indicado en la deficiencias de Cobre sean estas primarias ó secundarias. Prevención y tratamiento de la hipocuprosis causada por suelos bajos y alcalinos, excesos de sulfatos y molibdeno en aguas, pastos y suelo.

Manifestaciones clínicas con acromotriquia, deformaciones óseas, fracturas espontaneas, anestros prolongados, bajos porcentajes de preñez, muerte embrionaria.

DOSIFICACIÓN:

Terneros 1 ml

Novillos, vaquillonas, vaquillas, Torillos, 2 a 3 ml como dosis total.

Vacas 5 cc como dosis única.

Toros 6 cc como dosis única.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Suplemento mineral preventivo para corregir las carencias de este micronutriente en Bovinos.

VENTAJAS:



Alta concentración de sal orgánica de alta biodisponibilidad y acción sostenida. Estabilidad de sus componentes. Baja y segura dosificación. Amplio margen de seguridad. Excelente relación costo beneficio.

- Debe utilizarse bajo la estricta y atenta supervisión profesional.
- No administrar sin el diagnóstico correspondiente de carencia de Cobre.-

PRESENTACIÓN: Frasco ampolla de 500, 250 y 100 ml

29-15
Cooper
Farvig
NF

Cobre inyectable en
solución de alta
concentración y efecto
prolongado





FÓRMULA:

Edetato Cúprico sódico 9.40 gr
Excipiente acuoso csp 100.00 ml
Cada mililitro de 20-15
COOPERFARVIG NF
Contiene 15 mg de COBRE activo.

ESPECIES ANIMALES A LAS QUE DESTINA:

Bovinos y Bubalinos de todas las edades y categorías.

VIAS Y FORMA DE ADMINISTRACION Y APLICACION:

Injectable subcutánea exclusivamente, preferentemente en la tabla del cuello.

RECOMENDACIONES:

Generar reserva hepática fetal adminstrando Cooperfarvig NF a la hembra gestante siguiendo las recomendaciones de los tratamientos preparto. Administrar además en animales en crecimiento para mejorar la ganancia de peso en la joven edad. Respetar las dosis indicadas para cada grupo evitando los excesos de dosis ya que puede generar una intoxicación hepática aguda que puede terminar en la muerte del animal. Sin restricciones en la pre-faena.

Bovinos todas las edades y categorías.



VERDADERA REPOSICIÓN DE SALES DE MAGNESIO Y ZINC



INDICACIONES:

Principales:

- Prevención y tratamiento de la hipomagnesemia clínica y subclínica.



- Tratamiento de desbalances metabólicos por carencias nutricionales de magnesio y zinc.



Complementarias:

- Prevención y tratamiento del gabarro, Pododermatitis Proliferativa Plantar, grieta del pezón, llaga del prepucio y/o paraqueratosis.



- Para reducir el período de adaptación en animales que ingresan a Feed Lot.



- Previo al pastoreo de verdes estacionales o bien perennes como el agropiro, pasturas subtropicales degradadas, con deficiencia de Magnesio y Zinc. Cuando se encuentran rebrotes verdes luego de lluvias.



- Optimiza los procesos fermentativos y potencia la flora ruminal.

DOSIFICACIÓN:

Bovinos Terneros 3 a 5 ml

Novillos y Vaquillonas 6 a 8 ml

Vacas y Toros 8 a 12 ml

Ovinos, Caprinos, Camélidos y Porcinos

Jovenes 3 ml

Adultos 5 ml

VIAS DE APLICACION:

FarmagZinc es un inyectable listo para su uso. Se aplica por vía subcutánea, delante o detrás de la escápula, debiendo seguirse las normas elementales de seguridad y asepsia en la aplicación de este producto.

Farmag zinc

Solución inyectable
Magnesio Calcio y Zinc



PRESENTACIÓN: Frasco ampolla de 500, 250 y 100 ml

BOVINOS - OVINOS - CAPRINOS - CAMÉLIDOS - PORCINOS



FÓRMULA:

Activos:

Gluconato de Magnesio monohidrato	30.00 g
Gluconato de Calcio dihidrato	15.00 g
Gluconato de Zinc dihidrato	8.00 g
Agua bidestilada apirógena estéril cps	100.00 ml

ALTA CONCENTRACION, EFECTO SOSTENIDO Y LARGA ACCIÓN: EL MAGNESIO:

esta asociado íntimamente al calcio y al fósforo, tanto en su distribución como en su metabolismo. Un 70% del magnesio que contiene el cuerpo de un mamífero se encuentra en el esqueleto. La cantidad restante aparece ampliamente distribuida en los líquidos y en los tejidos blandos del cuerpo. Aproximadamente la tercera parte del magnesio presente en los huesos está disponible para ser movilizada hacia los tejidos blandos cuando la ingesta es inadecuada. Los valores normales a nivel sanguíneo son de 2 a 5 mg/dl.

La proporción importante que se encuentra fuera de los huesos, indica que su distribución en el cuerpo sigue los patrones del fósforo más que del calcio. De hecho, aunque el contenido de calcio es superior al del magnesio en el cuerpo, los tejidos blandos contienen

mucho más magnesio que calcio.

EL ZINC:

Junto con el hierro fue el primer microelemento descubierto y establecido como tal. Es al igual que el hierro constituyente fundamental de algunas proteínas. El Zinc es absorbido principalmente por el duodeno. Se fija a todas las proteínas del plasma, pero en su mayor parte está unido débilmente a la albúmina y esto es importante para su transporte hacia y desde los tejidos. La concentración plasmática de Zinc disminuye rápidamente ante la presencia de una dieta deficiente y durante la preñez. La principal vía de eliminación es la fecal: la excreción del zinc aumenta cuando existe catabolismo tisular como quemaduras, ayuno o infecciones y/o afecciones epidérmicas. En el sudor también se pierden cantidades significativas de zinc.

DESCRIPCIÓN DE FARMAGZINC:

Elevadas concentraciones de magnesio y zinc, de efecto inmediato y sostenido, con accionar en el interior de las "celulas blanco". Para el magnesio todas las fibras musculares lisas, y para el zinc, las células derivadas del ectodermo embrionario (fundamentalmente células epiteliales y de las glándulas secretoras y productoras de gametos).

INTERVALO ENTE APLICACIONES:

Todas las especies:

Terapéutica: cada 10 días hasta remisión de síntomas y no más de 3 repeticiones, siguiendo con la dosis preventiva.

Preventiva: cada 30 días.

Estratégica: con el rebrote verde, al ingresar al Feed Lot, situaciones de estrés, al ingresar en pasturas deficientes en magnesio y/o zinc

LA ENERGÍA DEL FÓSFORO HACIA LA PRODUCCIÓN GANADERA. LA VERDAD DEL FÓSFORO INYECTABLE, REFLEJADA EN BUENOS RESULTADOS



INDICACIONES:

Estados carenciales de Fósforo por aporte deficitario en la dieta animal. Desmineralización por excesos de producción lechera. Prevención de vaca caída por hipocalcemia, hipofosfatemia, e hipovitaminosis D.

Para el mejoramiento de los parámetros reproductivos, tales como anestros post-parto, alargamiento de períodos abiertos, celos silentes, infertilidad, vaca repetidora.

En desequilibrios nutricionales, por exceso de fibra en la dieta, para mejorar la conversión alimento-producción (más leche ó más carne).

Para cortar el círculo vicioso de bajo fósforo dietario - bajo nivel de fosfatos en saliva - pH ácido en el rumen-mala asimilación de nutrientes.

En casos preventivos y terapéuticos de raquitismo, osteomalacia, estrés de destete o desleche del becerro



VENTAJAS:

Combinación farmacológica de sales orgánicas e inorgánicas de Fósforo altamente biodisponible. Aporte vitamínico de Colecalciferol (D3), con positivo accionar sobre el metabolismo Fosfo-Cálcico.

Fácil aplicación, estabilidad de fórmula, uso en múltiples especies y categorías.

Probada eficacia en casos clínicos y en el mejoramiento de la producción animal.





FÓRMULA:

Glicerofosfato de Sodio anhidro	10.00 g
Vitamina D3 colocalciferol	500.000 UI
Hipofosfito de Sodio monohidrato	10.00 g
Agua bidestilada estéril csp	100.00 ml

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Suplemento preventivo, terapéutico, mineral y vitamínico.

DOSIFICACIÓN:


Bovinos: terneros: 5 a 10 ml., novillos y vaquillonas: 10 a 15 ml., vacas y toros: 15 a 20 ml. Ovinos - Caprinos - Camélidos y Porcinos: Jóvenes: 5 ml., adultos: 10 ml.

FRECUENCIA Y VÍA DE APLICACIÓN:

Injectable subcutánea ó intramuscular.
En forma preventiva dosificar cada 60 a 90 días. En la terapia curativa repetir a los 7 días y luego cada 15 ó 30 días.
Siempre según criterio profesional.

ESPECIES A LA QUE SE DESTINA:

Bovinos, Ovinos, Caprinos, Camélidos, Porcinos.



AZÚCARES, AMINOÁCIDOS Y VITAMINA B1 REGENERACIÓN Y PROTECTOR DEL PARÉNQUIMA Y FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO



INDICACIONES:

Principales: Tratamiento de alteraciones hepáticas de cualquier origen: infecciones bacterianas, víricas, parasitarias (distomatosis, anaplasmosis), metabólicas (cetosis acetonemia), tóxicas o desbalances nutricionales.



Complementarias: Recupera al animal de los excesos y desbalances nutricionales por modificaciones en la ración, exceso de proteínas (edema de ubre), déficit de energía (hígado graso, cetosis), alteración en el metabolismo de los carbohidratos.



- Estabiliza y desintoxica el sistema hepato-pancreático, devolviendo al animal su condición productiva.

En vacas lecheras de alta producción, son frecuentes los casos de acidosis. También se observan vacas caídas por acetonemia, procesos de intoxicación hepática por excesos de proteínas ó glúcidos.

Es imprescindible prevenir estos casos, pues afectan no sólo la producción láctea, sino que ponen en peligro la vida de nuestras mejores vacas.

Indicado en todo grupo de animales afectados por Hematozoarios (Anaplasmosis; Babesiosis y Tripanosomosis) como adyuvante en tratamiento de recuperación de la forma clínica de la enfermedad.

DESCRIPCIÓN:

Elevadas concentraciones de azúcar de alta y rápida metabolización, con directo accionar sobre la célula hepática (hepatocito).

Más Metionina y vitamina B1, de probados efectos regeneradores del tejido y parénquima del “organo filtro y depurador del metabolismo”.

Hepato protector

Regenerador y protector del parénquima y funcionamiento hepático



PRESENTACIÓN: Frasco ampolla de 500, 250 y 100 ml

BOVINOS - OVINOS - CAPRINOS - PORCINOS - EQUINOS



FÓRMULA:

Activos:	
Sorbitol	22.00 g
DL Metionina	4.00 g
Tiamina HCl	0.50 g
Agua bidestilada apirógena estéril csp	100.00 ml

DOSIFICACIÓN:

TRATAMIENTO PREVENTIVO:

1 ml c/50 kg. PV, repetir a la semana.

TRATAMIENTO DE URGENCIA:

Bovinos 2,5 ml c/10 kg. PV

Ovinos y Caprinos 0,6 ml c/10 kg PV

Porcinos 0,6 ml c/10 kg PV

Equinos 0,6 ml c/10 kg PV

VÍA DE APLICACIÓN:

Hepatoprotector es un inyectable listo para su uso. Se aplica por vía intramuscular profunda o vía endovenosa lenta, debiendo seguirse las normas elementales de seguridad y asepsia en la aplicación de este producto.

INTERVALO ENTRE APLICACIONES:

Las dosis indicadas podrán repetirse cada 24 hs hasta la recuperación del animal.

Continuar el tratamiento hasta desaparición de los síntomas.

En forma preventiva cuando se sospeche de efectos nocivos en el parto, aplicar 15 días antes de la fecha probable de parto, repitiendo a la semana ante parto y a los dos días posteriores a producirse el mismo.



**FORMULACIÓN ANTIBIÓTICA DE AMPLIO ESPECTRO
OXITETRACICLINA ASOCIADO CON UN ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDE,
DICLOFENACO SÓDICO EN UN VEHÍCULO ESPECIAL**



INDICACIONES:

Oxiflam está indicado para el tratamiento y control eficaz de enfermedades y procesos infecciosos causados por microorganismos Gram positivos, Gram negativos, micoplasmas, protozoarios y rickettsias sensibles a la oxitetraciclina en bovinos, ovinos, porcinos y caprinos.



Bovinos: neumonía (fiebre del embarque), pietín, metritis, septicemia, carbunco sintomático, enteritis bacterianas, actinobacilosis, infecciones articulares y umbilicales.



Prevención y tratamiento de infecciones genitales u obstétricas, heridas infectadas, anaplasmosis, leptospirosis.

Ovinos y caprinos: neumonías, pietín, prevención de infecciones post parto, carbunco sintomático, edema maligno, enterotoxemia, gangrena gaseosa (*Clostridium* spp), actinobacilosis, nefritis, cistitis, mastitis, otras infecciones causadas por gérmenes sensibles a la oxitetraciclina.

Porcinos: neumonía por *Pasteurella*, bronconeumonía, síndrome MMA, control de rinitis atrófica, leptospirosis, diarrea de los lechones, otras infecciones causadas por gérmenes sensibles a la oxitetraciclina.

ACCIÓN:

Antibiótico de amplio espectro, antiinflamatorio, antipirético y analgésico. Generalmente una sola inyección es suficiente para combatir los microorganismos sensibles a la oxitetraciclina. Debido a su acción prolongada y su liberación lenta, el nivel sanguíneo se mantiene por un plazo de 3 a 5 días.

**Oxiflam
LA**

Antibiótico inyectable de
amplio espectro
Analgésico, antiinflamatorio
y antifebril



PRESENTACIÓN: Frasco ampolla de 500, 250 y 100 ml

BOVINOS - OVINOS - CAPRINOS - CAMÉLIDOS - EQUINOS - PORCINOS



FÓRMULA:

Oxitetraciclina base: 20 g
Diclofenaco sódico: 0,50 g
Excipientes c.s.p.: 100 ml

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:

No administrar a animales con antecedentes de alergia a las tetraciclinas y/o al diclofenaco.

Para evitar posibles reacciones locales, se recomienda no administrar más de 10 ml por punto de inoculación en bovinos adultos ó 1-2 ml en terneros ó 5 ml en terneros ó 5 ml en ovinos y caprinos.

EFFECTOS COLATERALES:

La administración puede producir reacciones localizadas en el punto de aplicación que desaparecen en poco tiempo. En animales hipersensibles puede producir reacción alérgica general (anafilaxia). Estas reacciones son de muy escasa frecuencia, pero de ocurrir se debe suspender el tratamiento y administrar epinefrina y/o antihistamínico según corresponda.

RESTRICCIONES DE USO:

No administrar a hembras lecheras bovinas, ovinas y caprinas en período de lactancia cuya leche se destine a consumo alimentario humano deberán transcurrir 28 días después de la última aplicación.

DOSIFICACIÓN:

La dosis general es de 1 ml/10 kg de peso, equivalente a 20 mg de oxitetraciclina base por kg de peso.

Administrar por vía subcutánea en terneros, corderos y cabritos. En animales de gran porte administrar por vía intramuscular profunda en grandes masas musculares.

En lechones hasta 10 kg de peso administrar por vía subcutánea, en animales que superen los 10 kg de peso administrar por vía intramuscular.

DOSIFICACIÓN ESPECIES:

Administrar por vía intramuscular profunda 1 ml cada 10 kg de peso vivo según las siguiente indicaciones:

Cuando la dosis sea mayor a 20 ml, se recomienda aplicarlo en dos lugares diferentes.

En **porcinos** no aplicar más de 10 ml en el punto de inyección. En el caso de los **ovinos y caprinos** no aplicar más de 5 ml en punto de inyección.

Porcinos: de 2,5 a 5 kg, 1/4 a 1/2 ml; de 5 a 10 kg, 1/2 a 1 ml; de 10 a 20 kg, 1 a 2 ml; de 20 a 45 kg, 2 a 4 ml; de 45 a 90 kg, 4 a 8 ml; más de 90 kg, 6 a 10 ml.

Ovinos y caprinos: menores a 5 kg, 1/4 a 1/2 ml; de 5 a 10 kg, 1/2 a 1 ml; de 10 a 20 kg, 1 a 1 1/2 ml; de 20 a 45 kg, 2 a 4 ml; más de 45 kg, 4 a 8 ml.

Vacunos, camélidos y equinos: menos de 45 kg, 2 a 4 ml; de 45 a 90 kg, 4 a 8 ml; de 100 a 230 kg, 8 a 15 ml; de 230 a 350 kg, 10 a 20 ml; más de 350 kg, 20 a 30 ml.

SAL ORGÁNICA DE ALTA BIODISPONIBILIDAD DE COBRE INYECTABLE BIODISPONIBILIDAD Y SEGURIDAD PARA LAS GRAVES CARENCIAS DE COBRE



INDICACIONES:

Para el tratamiento principal de estados carenciales producidos por deficiencia de Cobre. Trastornos de asimilación, normalización de tales carencias para colocar al animal en las mejores condiciones frente a las discrasias hemáticas y todo tipo de deficiencias de Cobre. Indicado tanto en deficiencias de Cobre primarias y/o secundarias.

DOSIFICACIÓN:

1 ml/100 KPV. dosis máxima 4 ml.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Suplemento Preventivo, terapéutico, mineral.
Para la reposición del oligoelemento Cobre.

ESPECIES ANIMALES A LAS CUALES SE DESTINA:

Bovinos: de todas las edades
y categorías.

VIAS Y FORMAS DE APLICACIÓN:

Inyectable subcutánea, exclusivamente,
con los recaudos lógicos de toda administración parenteral.
Recomendamos la aplicación en el cuello
por delante de la paleta.

FÓRMULA:



Glicinato de Cobre monohidratado*	9,08 g % p/v
Sodio Citrato anhidro	0,54 g % p/v
Polivinil Pirrolidona	0,50 g % p/v
Ácido Fénico	0,50 g % p/v
Agua destilada C.P	100 ml
* Equivalente a 25 mg de Cobre por ml.	

Cooper Farvig

Antibiótico inyectable de
amplio espectro
Analgésico, antiinflamatorio
y antifebril



PRESENTACIÓN: Frasco ampolla de 500, 250 y 100 ml

COBREMEX en Venezuela

SOLUCIÓN ACUOSA INYECTABLE DE COBRE, ZINC, MANGANESO Y SELENIO



INDICACIONES:

FARMIN es un suplemento mineral inyectable acuoso para la prevención y el tratamiento de estados carenciales de cobre, zinc, manganeso y selenio. El zinc, el cobre y el manganeso son componentes integrales en este sistema debido a su presencia en la superóxido dismutasa, que reduce el superóxido de radicales libres a peróxido de hidrógeno. Por su parte, el selenio es un componente de la glutatión peroxidasa que luego convierte el peróxido de hidrógeno en agua.

Sin embargo, en tiempos de estrés, la tasa de producción de radicales libres puede exceder su tasa de neutralización por el sistema antioxidante y puede conducir al daño oxidativo de los lípidos, carbohidratos y proteínas dentro de las células. Ejemplos de tales momentos de estrés oxidativo incluyen el parto, las infecciones y el estrés por calor. La suplementación con minerales traza acondiciona al animal para estos momentos de estrés de manera de reducir el daño oxidativo a las células y metabolitos.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE APLICACIÓN:

FARMIN se administra exclusivamente por inyección subcutánea. La dosis recomendada es de 1 ml cada 100 kilos de peso vivo. En ningún caso aplicar más de 5 ml por animal. Cada mililitro de **FARMIN** aporta 20 mg de cobre, 40 mg de zinc, 10 mg de manganeso y 5 mg de selenio.



FÓRMULA:

Edetato de cobre disódico 1	12,58 g
Edetato de zinc disódico dihidrato 2	26,65 g
Edetato de manganeso disódico dihidrato 3	7,75 g
Selenito de sodio anhidro 4	1,10 g
Excipientes c.s.p.	100,00 ml

Farmin Fertilidad

Suplemento preventivo
y Terapéutico - Mineral



PRESENTACIÓN: Frasco ampolla de 500, 250 y 100 ml

PENETRA EN LA PEZUÑA PARA PROTEGER LA PUDRICIÓN DE LA MISMA CURA RÁPIDAMENTE LA COJERA DEL ANIMAL



INDICACIONES:

Antiséptico de uso externo para la prevención y el tratamiento de procesos infecciosos del pie del ganado bovino, ovino y caprino: dermatitis digital, dermatitis interdigital, flemón interdigital.

GelCuZn es indoloro y fácil de utilizar, no es pegajoso ni deja restos en la piel. No produce decoloración ni endurecimiento de la pezuña, ni hace que se vuelva quebradiza o se encoja. No mancha ni afecta la lana. No deja residuos y no requiere período de retiro en leche.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

El producto se presenta listo para usar. Cuando resulte necesario, previo al tratamiento, limpiar y recortar los cascos afectados para eliminar todos los tejidos muertos, necrosados, sueltos y/o socavados, respetando al máximo los tejidos sanos, y tratando de dar la mejor forma posible a la estructura córnea. Controlar cualquier sangrado antes de aplicar el producto. Mientras se mantiene la pezuña invertida, cubrir la lesión y el área circundante con abundante GelCuZn, saturándola. Vendar el casco para una mejor curación. Dejar la venda así colocada de 3 a 4 días. Durante ese lapso, mantener al animal en un área con piso limpio y seco. Mantener separados a los animales tratados.

VIAS DE ADMINISTRACIÓN:

La administración del producto se realiza de forma tópica, depositándolo sobre la zona afectada con ayuda del pico aplicador.

Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.



FÓRMULA:

Composición:

Cada 100 g contiene:

Edetato de cobre y zinc 5,00 g

Acido Salicílico 1 g

Agentes de formulación c.s.p. 100 g

**Gel
CuZn**

Antiséptico y
desinfectante
Gel de uso tópico



PRESENTACIÓN: Pote aplicador de 500 grs.

TRATAMIENTO TERNEROS AL PIE DE LA MADRE



CONCLUSIONES:



Se puede observar que los animales tratados tienen ganancias de peso superiores a los testigos.

Las Hembras tratadas ganan 22,42 kg más que las testigo.

Los Machos tratados ganan 9 kg más que los testigo.

Las diferencias en ambos grupos son importantes.

Por lo expuesto se recomienda la suplementación inyectable con **Cooperfarvig NF** y **FarmagZinc** al pie de la madre al destete y en la etapa de recría.



La Victoria Esquina Ctes		
Vaq. N= 38	Tratamiento	Lote Testigo
Animales por grupo	Cooperfarvig NF 2 cc, FarmagZinc 4 cc	
Inicio PV kgr 21/10/13	294,12	297
Final 30/01/14	328,54	309,04
Dif. GPV kgr	34,42	12,04
Dif. GPV Prom Kg.	22,38	
GPV grs/día	340	119
Dif. GDP %	185,72%	
	Duración de la prueba 101 días	

La Victoria Esquina Ctes		
38 machos de cada grupo	Tratamiento	Lote Testigo
	Cooperfarvig NF 2 cc, FarmagZinc 4 cc.	
Inicio PV kg. 21/10/14	218,45	214,62
Final 27/02/14	314,24	297,03
Dif. GPV kgr	95,79	82,41
Dif. GPV Prom Kgrs Trat. Vs Test	13,38	
GPV grs/día	742	639
Dif. GPV %	16,11%	
	Duración de la prueba 129 días	

VACAS DE CRIA / TRATAMIENTO - TEMPORADA DE MONTA

45 Días antes de
la Temporada de monta



Inicio 15 días antes
ó al inicio



Mitad



Con la aplicación de este tratamiento

- Concentrará la mayor cantidad de servicios al inicio de la temporada.
- Evitará las costosas repeticiones de celo.
- Obtendrá más terneros por año.
- Podrá programar temporadas de monta más cortas.



Nota: Este tratamiento puede ser modificado a criterio de su Médico Veterinario

PROBLEMAS PODALES / TRATAMIENTO CURATIVO

DIA 0



DIA 10



DIA 20



Con la aplicación de este tratamiento

- Resolución metabólica de la podo dermatitis (casquera).
- Evitará reincidencia del problema.
- Fortalecerá la pezuña de sus animales.
- Se recomienda el uso combinado de antibióticos.



Nota: Este tratamiento puede ser modificado a criterio de su Médico Veterinario.

Como preventivo Farmagzinc y CooperFarvig cada 60 días

TRATAMIENTO / VACAS Y VAQUILLONAS PREÑADAS



Con la aplicación de este tratamiento

- Evitará las retenciones placentarias.
- Acortará el período parto concepción.
- Evitará las costosas repeticiones de celo.
- Obtendrá más terneros por año.
- Obtendrá terneros más fuertes y pesados.



Nota: Este tratamiento puede ser modificado a criterio de su Médico Veterinario

TRATAMIENTOS / VACAS EN ANESTRO / VACA PROBLEMA



Con la aplicación de este tratamiento

- Evitará las retenciones placentarias.
- Acortará el período parto concepción.
- Evitará las costosas repeticiones de celo.
- Obtendrá más terneros por año.
- Obtendrá terneros más fuertes y pesados.



Nota: Este tratamiento puede ser modificado a criterio de su Médico Veterinario